

躁動七合一(檢驗代碼 07068)

中文	英文/健保碼	簡稱	臨界濃度/適應症與臨床應用
安非他命	Amphetamine/10810B	AMP	臨界濃度：Negative(<500 ng/mL) 。安非他命及其代謝物質是一種中樞神經刺激劑，急劇高劑量會使人產生興快感、警覺及感覺增加活力及力量。更高劑量會產生焦慮、偏執妄想、精神異常、心律不整等現象。
搖頭丸	3, 4-methylenedioxymethamphetamine/10801B	MDMA	臨界濃度：Negative(<500 ng/mL) 。(3, 4-methylenedioxymethamphetamine, MDMA) 俗稱快樂丸，搖頭丸，狂喜，Ecstasy 等。3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命除了具有安非他命類藥物刺激中樞神經之特性外，也另具有迷幻藥 (Hallucinogen)之效果。與甲基安非他命一樣，3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命還會有咬緊牙關、磨牙、瞳孔放大、出汗、焦慮、視線模糊、嘔吐、血壓上升、心跳加快等作用，過量時可能會造成心臟衰竭。3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命以藥丸或膠囊之方式攝入，由尿液排出此毒品及其代謝物質。
天使塵	Phencyclidine/10814B	PCP	臨界濃度：Negative(<25 ng/mL) 。俗稱"天使塵"是一種芳香環己酰胺(aryl cyclohexyl-amine)，原被用作麻醉劑及獸用鎮定劑。濫用方式有口、鼻直接攝入、吸入煙霧、靜脈注射。吸收都很快速，會使人產生幻覺、昏睡、喪失方向感及協調性、恍惚、狂喜、興快感及視覺扭曲等。由尿液排出約攝入劑量的百分之十。
愷他命	Ketamine/10801B	KET	臨界濃度：Negative(<300 ng/mL) 。俗稱卡門、K、Special K 等，為非巴比妥鹽類的麻醉劑、止痛劑，臨床上應用於動物手術、急診醫學方面，具有使服用者的意識狀態進入潛意識，而使人產生與現實環境脫離的作用，法定名稱「愷他命」，通常以口服、鼻吸、煙吸及注射等方式施用藥效約可維持一小時，但影響吸食者感覺、協調及判斷力則可長達 16 至 24 小時，並可產生噁心、嘔吐、複視、視覺模糊、影像扭曲、暫發性失憶及身體失去平衡等症狀。
甲基安非他命	Methamphetamine/10801B	MET	臨界濃度：Negative(<500 ng/mL) 。由尿液代謝出安非他命及去胺基 (deaminated)或經基化 (hydroxylated)之衍生物。部分的甲基安非他命也會以原形出現在尿液中。
古柯鹼	Cocaine/10812B	COC	臨界濃度：Negative(<300 ng/mL) 。古柯鹼在古柯 (Coca)植物內發現，有刺激中樞神經及局部麻醉的效果。對生理的影響為產生興快感、自信、增加活力、心跳加速、瞳孔放大、發熱、發抖、流汗等。古柯鹼在短期內會代謝為苯甲醯基愛哥寧(Benzoylecgonine)並由尿液排出來。苯甲醯基愛哥寧的生理半衰期為 5 到 8 小時，遠比古柯鹼(Cocaine)的 0.5 到 1 小時長，且在接觸或吸食古柯鹼後 24 到 60 小時內可被測得。
大麻	Tetrahydrocannabinol/10813B	THC	臨界濃度：Negative(<50 ng/mL) 。一般被認為是大麻中之活性成分。當吸入或食入大麻時，會產生興快感。濫用者會有中樞系統方面的影響，如情緒、感知的改變、失去協調感、短期記憶受損、焦慮、偏執、沮喪、混淆、妄想及心跳加速等。吸入大麻後，會經由肝臟代謝，從尿液排出其代謝物 - 四氫大麻酚-9-甲酸 (11-nor-delta-9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid)。因此，當尿液中出現大麻鹼 (Cannabinoids)，包含主要的羧基化代謝物，則表示有吸食大麻/印度麻 (Marijuana/Cannabis)。