

過敏性止咳劑

“威德” 息咳寧糖漿

Secorine Syrup "Center"

衛署藥製字第 040833 號

主 成 份：每毫升(ml)含有

dl-Methylephedrine Hydrochloride.....	1.0 mg
Chlorpheniramine Maleate.....	0.1 mg
Glyceryl Guaiacolate.....	5.0 mg

適 應 症：

緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咯痰)

用法用量：醫師藥師藥劑生指示藥品

成人：一日服3~4次，每次10毫升。

6~12歲：一日服3~4次，每次5毫升。

3~6歲：一日服3~4次，每次2.5毫升。

3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

藥理作用：

1. dl-Methylephedrine Hydrochloride：(甲基鹽酸麻黃鹼)對氣管炎及支氣管炎有止咳解痙等支氣管擴張作用，亦能解除充血性支氣管炎，且無一般麻黃鹼所引起如心悸、出汗、興奮、脈搏加速及失眠等副作用。
2. Chlorpheniramine Maleate：(氯化比立特命蘋果酸鹽)為具抗過敏作用之抗組織胺劑，吸收快、作用迅速且副作用極低。
3. Glyceryl Guaiacolate：(甘油基癒瘡木酚)是療效卓著的祛痰劑，可使呼吸道濃稠的黏液減低表面張力，吸收水分，潤濕氣管，去除黏膜刺激，使濃痰變稀薄而易於咳出，並且可以減少咳嗽次數，故本劑有助於氣管炎、感冒、及咽喉炎等引起咳嗽之咯痰。

注意事項：

1. 除非有醫師、藥師、藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用，且服用本藥時不得併服其他藥品。
2. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
3. 不得併服含酒精之飲料。

警 語：

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
2. 3歲以下孩童，請依照醫師、藥師、藥劑生指示服用。
3. 對藥物過敏者不得使用。

- 4.若咳嗽持續一星期以上，或有發燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
- 5.氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用此藥。
- 6.不要過量服用，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
- 7.不要服用本藥超過七天。
- 8.服用本藥後，如果症狀沒有改善或併有發燒持續三日，應停藥立即就醫。
- 9.服用本藥後喉嚨疼痛持續兩日以上，並併有發燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
- 10.服用本藥後，可能引起嗜睡現象，開車或操作重機械應小心，不要飲用酒精飲料，亦不可服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
- 11.除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本劑：青光眼、肺氣腫、呼吸急促或呼吸困難、或因前列腺腫大引起之排尿困難等。
- 12.本藥含有支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。
- 13.本品含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用。

包裝：60-4000毫升塑膠瓶裝

儲存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封儲存於25°C以下，請勿冰存並避免陽光直射。

麗德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

麗德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-017 20120222

14S03-B01