呼吸道黏液溶解劑

愛克痰®顆粒 66.7 毫克/公克

Actein® Granules 66.7mg/gm

【特性】

- 本藥係採用祛痰劑 Acetylcysteine 為主成分，所研合而成之顆粒劑。
- Acetylcysteine 能幫助黏液(例如：痰液)分解，降低痰的粘稠度而更容易排出。

【成分】

有效成分及含量

每公克中含有：

Acetylcysteine ..... 66.7mg.

其他成分(賦形劑)

Dextrose、Sunset Yellow FCF、Saccharin Sodium、Orange Powder

【用途(適應症)】

減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

【使用上注意事項】

一、 有下列情形者，請勿使用：

(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。

二、 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。

(二) 3 歲以下。

(三) 支氣管性氣喘及伴有呼吸功能不全的人。

三、 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二) 65 歲以上。

四、 其他使用上注意事項：

(一) 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議使用量。

(四) 不得與含酒精飲料併用。

(五) 本藥會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如無法自行咳出，建議採用變換姿勢、拍痰或機械抽取等適當的處理步驟。

【用法用量】

年齡	劑量
成人及 12 歲以上	成人每次 3 公克，一天 3 次。
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2。

3 歲以上未滿 6 歲	適用成人劑量之 1/4。
3 歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

一、 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 若有任何不適情形產生。

(二) 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發情形。

(三) 消化道：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。

偶有發疹等過敏症狀。

其他：偶有血痰、惡寒、發熱、鼻水流不停、口內炎症狀發生。

【包裝】

6-333 包盒裝，1.5gm, 3gm 鋁箔包裝。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品

【貯存條件】

本品極易吸濕，請貯存於 25℃以下乾燥處所。

衛署藥製字第 037598 號

委託者：健喬信元醫藥生技股份有限公司

303 新竹縣湖口鄉光復北路 21 巷 4 號

製造廠：優良化學製藥股份有限公司

303 新竹縣湖口鄉中興村光復路 10 號