

產瘤及頭部血腫

新生兒頭部很可能會因為經過媽媽狹窄的產道，而在腦部產生腫塊的情況如下：

一、產瘤（Caput succedaneum）

- 1.由於生產過程中因產道的擠壓頭皮上軟組織水腫，可能會出現胎頭腫塊（產瘤），產瘤會於出生後的12小時到數天內漸漸被吸收，先觀察其變化（如圖一）。



圖一 產瘤

二、頭部血腫（Cephalohematoma）

- 1.頭骨表面與骨膜間血管破裂，導致血液聚積而形成的血腫塊，此因生產過程壓擠導致頭頂骨膜下出血（如圖二）。



圖二 頭部血腫


- 2.出生後2~3天慢慢增加，在頭部側面可摸到一較有張力的腫塊，數天後，因其內血液凝固，血塊腫的邊緣較硬。
- 3.常見於頂骨，其次為枕骨部，不會橫過股縫合處，多為單側發生，少數兩側都有。
- 4.頭血腫多不需要特別處理，在出生後2週~3個月內逐漸自然吸收消退。

產瘤及頭部血腫

- 5.少數會因鈣化而在該處可持續摸到硬塊。
- 6.若頭血腫變大，該處的皮膚變紅，則要懷疑是否已發生感染，寶寶也可能出現發燒或白血球增高，此時要盡快將寶寶送去就醫。
- 7.可能會發生黃疸現象（此乃吸收血塊造成所致）。

三、硬膜下血腫（Subdural hematoma）

- 1.範圍大、較硬、危險性高（如圖三）。
- 2.可能合併神經學症狀（包括：抽搐、活動力欠佳、食慾差、嘔吐...等）及貧血。
- 3.住院中若有任何問題，請告知醫護人員；若於返家後有問題請帶寶寶就醫。



圖三 硬膜下血腫

參考資料

- 張詠涵、蔡金杏（2019）．新生兒護理．於周汎濤總教閱，*產科護理學*（四版，13-04～13-69）．永大。
- 孫瑞瓊（2020）．新生兒的護理．於余玉眉總校閱，*產科護理學*（十版，428-483）．新文京開發。
- 孫瑞瓊（2022）．新生兒的護理．於余玉眉總校閱，*產科護理學*（十一版，454-515頁）．新文京開發。
- 曹英、黃惠滿（2022）．兒童身體評估．身體檢查與評估指引（四版，487-535頁）．新文京開發。