



# 腹膜透析與血液透析之比較

| 特 性             | 腹 膜 透 析(洗 肚 子)                                                                                                                                                               | 血 液 透 析(洗 血)                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水的變動情形<br>水分與毒素 | <p>緩慢，變動平穩</p>  <p>時間(天)</p>                                                                | <p>快速，變動大</p>  <p>時間(天)</p>                                                                                   |
| 飲 食             | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 不限青菜水果</li> <li>❖ 鼓勵魚肉蛋奶、黃豆製品、低鹽，適度限糖</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 限青菜水果</li> <li>❖ 限水限鹽</li> <li>❖ 適量魚肉蛋奶、黃豆製品</li> </ul>  <p>控水控鹽</p> |
| 貧血程度            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 無血液流失的機會</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 有血液流失的機會</li> </ul>                                                |
| 起病情<br>療時不適     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 毒素、水份平穩地被移除，較無無痛苦或不適</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 毒素、水份快速移除，易產生透析後不適(噁心、嘔吐、頭痛、高/低血壓)</li> </ul>                                                                                                           |

末期腎臟病患選用合適的透析治療方式，確保照護品質，建議在進入透析前，病患應與醫生討論較適當的透析治療方式。

※諮詢地點：東院區門診大樓 二樓腎臟衛教室

※諮詢時間：週一~週五 09:30~12:00、14:00~17:00

※諮詢電話：2765041 轉 2220



戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 關心您！

# 腹膜透析與血液透析之比較

何時需進入  
透析治療

根據健保局的規定，區分兩種適應症：

1. 腎臟廓清率小於5c.c/每分鐘以下，或血中肌酸酐大於10以上的患者，必須要洗腎。
2. 血中肌酸酐8.0mg/dl.出現與尿毒有關之症狀：噁心、嘔吐、食慾不振、皮膚癢、呼吸困難、四肢及心肺積水、口腔有異味、意識改變，包括昏睡、疲倦、譫妄、昏迷

| 特 性                        | 腹 膜 透 析(洗肚子)                                                                                                                                                                                                                                       | 血 液 透 析(洗血)                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 透<br>析<br>通<br>路           | <p>❖腹膜透析導管(健保給付)</p> <p>❖不需打針</p>                                                                                                                                | <p>❖須預先手術動靜脈瘻管</p> <p>❖門診開刀(健保給付)</p> <p>❖每次需打兩針</p>  |
| 透<br>析<br>場<br>所           | <p>居家/學校/工作場所/車上</p>                                                                                                                                            | <p>醫院血液透析室</p>                                       |
| 透<br>析<br>時<br>間<br>安<br>排 | <p>❖居家彈性安排</p> <p>❖手洗：換液一天三至四次，每次30分</p>  <p>❖機器洗：晚上或休息時機器自動換液每天8-10個小時</p>  | <p>❖依照醫院安排，固定時間及床位</p> <p>❖一週洗三次：一次4小時</p>           |