

包皮手術術後須知

一、傷口照護

- ☐ 以小棉棒沾煮過冷開水或生理食鹽水清洗傷口，再塗上藥膏。
- ☐ 傷口勿碰水，可使用擦澡，每日至少換藥 1 次，再塗上少量藥膏(如傷口滲濕請立即更換)。
- ☐ 傷口微腫脹及滲出黃色液凝結於龜頭表面，表示正常；一星期後腫脹漸消，結痂經沖洗會軟化脫落，縫線會自行吸收脫落，不必拆線。

二、藥物

- ☐ 請按時服用醫師開立之藥物。

三、注意事項

- ☐ 傷口有紅、腫、熱、痛或持續出血時，應立即回本院急診或門診處理。
- ☐ 避免觀看刺激性影片及書刊。
- ☐ 可穿質軟寬鬆沒拉鏈之褲子。
- ☐ 減少抽菸（含電子煙）及二手煙，尤其在傷口未癒合前。

四、回診

- ☐ 請按醫師指示回門診追蹤。

參考文獻

- 李慈音（2021）．兒童泌尿生殖系統疾病及其護理．於陳月枝總校閱，實用兒科護理（九版，607-611 頁）．華杏。
- 羅靜婷（2021）．皮膚系統功能障礙之護理．於李皎正總校閱，內外科護理技術（第九版 414-428 頁）．新文京。