

# 高血壓日常生活須知

高血壓是中風、心臟病及腎臟病和眼疾的重大危險因子,是血管硬化 性和心臟病的助因;高血壓是一種「無形殺手」,若不去量血壓,無法察覺 血壓高。一旦發現血壓升高後,就須定期測量血壓,終身不可懈怠。

### 一、何謂血壓

【血 壓】-血流衝擊血管所引起的一種壓力。

【收縮壓】-心臟收縮時把血液打到血管,此時測得的血壓即是收縮壓。

【舒張壓】-心臟不收縮時,此時測得的血壓即是舒張壓。

表一、血壓參考值

血壓分類	收縮壓(毫米汞柱	)	舒張壓(毫米汞柱)
正常血壓	< 120		< 80
偏高	120~129	且	< 80
高血壓第一期	130~139	或	80~89
高血壓第二期	≥140		≥90

資料來源: 2022 Guidelines of the Taiwan Society of Cardiology and the Taiwan Hypertension Society for the Management of Hypertension

### 二、高血壓的症狀

- 1.有些人沒有症狀,即使血壓異常高,病人未必會感到不舒服。
- 2.有些人會有頭昏、失眠、頭重感、頭痛、耳鳴、重聽、心跳、頸肩部僵硬、視力模糊;嚴重者甚至有噁心、嘔吐、抽搐、跛行、昏迷等症狀。
- 3.當病程進展影響到重要器官時,出現腦部、眼睛、心臟、腎臟、周邊血管的合併症,是造成病人死亡的主因。
- 4. 不管有沒有不舒服的症狀,高血壓一定要治療。

## 三、掌握「722」原則,做好居家血壓管理





# 高血壓日常生活須知



圖片來源:https://www.ths.org.tw/%E6%B0%91%E7%9C%BE%E8%A1%9B%E6%95%99/%E6%AD%A3%E7%A2%BA%E6%B8%AC%E9%87%8F%E8%A1%80%E5%A3%93-722%E5%8E%9F%E5%89%87

#### 四、降壓六字訣

- S--減鈉(Salt restriction):每日食鹽量 5 公克,忌食含鈉量極高的麵線、蜜餞、餅乾等:含鈉量較高蔬菜,如:芹菜、胡蘿蔔、海帶、紫菜。
- A—戒酒(Alcohol limitation):喝酒會影響藥物的治療成效以及血壓的變化。
- B—減重(Body weight reduction):建議成人 BMI 維持 20~24.9kg/m 2, BMI≥24 (過重)為糖尿病、心血管、惡性腫瘤等慢性病高危險因子。
- C—戒菸(Cessation of smoke): 菸品中的焦油等有害成分會損害血管,無論傳統 香菸還是電子煙,都要完全戒菸。
- D—飲食控制(Diet adaptation):得舒飲食,強調低脂、少鹽、低糖飲食,多蔬果,選擇全穀類並適時補充堅果。
- E—運動(Exercise adaptation):
  - 1.定期有氧運動 (每週 5~7天至少 30 分鐘中等強度運動)。
  - 2.神經運動鍛鍊或訓練,如:太極、瑜珈、冥想。
  - 3.高血壓未控制的病人(收縮壓>160mmHg)不建議進行高強度運動。

#### 參考資料

- 歐嘉美、林春只、尚忠菁、陳蓓蒂、周幸生(2023)·高血壓·王桂芸、劉雪娥、馮容芬總校閱, 新編內外科護學(七版,下冊,10-121~10-137頁)·永大。
- Wang, T. D., Chiang, C. E., Chao, T. H., Cheng, H. M., Wu, Y. W., Wu, Y. J., Lin, Y. H., Chen, M. Y., Ueng, K. C., Chang, W. T., Lee, Y. H., Wang, Y. C., Chu, P. H., Chao, T. F., Kao, H. L., Hou, C. J., Lin, T. H. (2022). 2022 Guidelines of the Taiwan Society of Cardiology and the Taiwan Hypertension Society for the Management of Hypertension. Acta Cardiol Sin, 38(3), 225-325. https://doi.org/10.6515/ACS.202205\_38(3).20220321A

院址:600 嘉義市忠孝路 539 號 網址: www.cych.org.tw 諮詢服務電話:05-2765041 7A 病房:轉 3792、3793 護理部 7A 病房制訂/神經內科協助審視/營養科協助審視/護理指導組審閱

編號 A003 修訂日期: 2024年08月14日