

小兒隱睾術後須知

一、進食時間

確定孩子清醒後才能給予喝水，30分鐘後無嘔吐情形再正常進食。

二、藥物

請按時服用醫師開立之藥物。

三、傷口照護

腹股溝傷口覆蓋的透明膠膜勿主動撕掉，不需換藥，直到回診。

腹股溝陰囊處有些微腫，皮下瘀血或硬塊是正常的現象，數週後會漸漸消失。

陰囊傷口：

藥膏塗敷於陰囊處傷口，一日3~4次。

陰囊傷口上透明膠膜，勿主動移除，若鬆脫則移除，之後藥膏塗抹一日3~4次，勿碰生水。

若有大便沾染，請儘速以生理食鹽水沖洗乾淨、擦乾並上藥膏。

陰囊傷口三週內勿重壓或用力摩擦（例如：使用螃蟹車、學步車）。

陰囊傷口不適用使用溼紙巾照護，尿布要較常更換。

傷口不需拆線。

四、注意事項

術後孩子少有發燒或想吐現象，通常一天內恢復正常。

五、回診

請按醫師指示回門診追蹤。

術後3~6個月左右回診追蹤睪丸。

參考資料

李慈音（2021）・兒童泌尿生殖系統疾病及其護理・於陳月枝總校閱，實用兒科護理（九版，604-606頁）・華杏。

周慧琳（2021）・手術後期的護理技術・於李滿梅編著，內外科護理技術（九版，152-155頁）・華杏。