

# 小兒肛門瘻管術後須知

## 一、進食時間

確定孩子清醒後才能給予喝水，30分鐘後無嘔吐情形再正常進食。

## 二、藥物

請按時服用醫師開立之藥物。

## 三、傷口照護

第一次解便或術後4小時後，將填塞傷口之敷料完全移除。

保持傷口清潔，一日兩次及便後以優碘溶液(1:20)沖洗傷口，棉棒吸乾水份後塗抹藥膏。

若使用NewEpi，則須再塗抹藥膏前噴灑，等待至少2分鐘，再塗抹藥膏，每日可噴2~3次。

可一日兩次溫水坐浴(洗澡水的溫度)約3~5分鐘，可促進傷口癒合。

術後傷口沒有縫合，看似很大，約二~三星期逐漸癒合，每週返診檢查一次。

## 四、注意事項

術後孩子少有發燒或想吐現象，通常二天內恢復正常。

## 五、回診

請按醫師指示回門診追蹤。

## 參考資料

周慧琳(2021) · 手術病人護理 · 於李滿梅編著，內外科護理技術(九版，137-143頁) · 華杏。  
李慈音(2021) · 兒童泌尿生殖系統疾病及其護理 · 於陳月枝總校閱，實用兒科護理(九版，607-611頁) · 華杏。