

化學藥品灼傷的緊急處理

皮膚直接接觸具有強力腐蝕性的化學物質，如：強酸、強鹼、有機化合物等所造成的傷害；從家用清潔劑到各種工業、農業或軍用的各種化學物，皆可能造成灼傷。其嚴重度依化學物質的種類、濃度、量、接觸時間與部位而定。

一、症狀

1. 局部性疼痛、燒灼感。
2. 灼傷處皮膚出現脫色情形。
3. 灼傷處周圍組織水腫。

二、緊急照護

1. 立即去除沾有化學物質的衣服，必要時剪開衣物減少化學物品接觸皮膚的面積。
2. 將身上手錶、鞋子及首飾取下。
3. 使用生理食鹽水或清水清洗病人身上的化學物質，需用大量流動的冷水清洗，勿將患處浸在冷水中，以防造成進一步傷害；需持續沖水至少 20~30 分鐘。如為眼睛灼傷則同樣使用生理食鹽水或清水由內眥往外沖洗，切勿將化學物質沖至另一眼。
4. 禁用中和劑，因中和反應時會產生熱，造成組織進一步傷害。
5. 沖洗後用乾淨毛巾予以拍乾，勿用力擦拭。
6. 使用乾淨敷料覆蓋灼傷處。
7. 確定造成損傷的化學物質為酸或鹼。



化學藥品灼傷的緊急處理

三、注意事項

- 1.家中最好不要儲存強酸強鹼等危險物品，清洗廚房浴室宜使用較安全之清潔劑。
- 2.化學物品應妥善保管，勿以飲料空瓶來盛裝上述危險溶液，以免幼童誤食。
- 3.若可能的話，將化學藥物的名稱記住，並攜帶化學藥物之容器至醫院。
- 4.勿於灼傷處塗抹：醬油、沙拉油、牙膏、消炎粉等，以防無法散熱，使傷口增加感染。
- 5.化學性灼傷，最重要的是儘速用水完全地沖洗，千萬不要用化學物品或中和溶液，如：醋、蘇打水中和，否則會造成更嚴重的傷害。

參考文獻

- 林貴滿、林素戎(2023)・第 15 章皮膚疾病之護理，內外科護理學下冊(七版，360-361 頁)・華杏。
- 陳惠娟、劉英妹、廖雅惠、白玉珠(2023)・18 章皮膚系統疾病與護理，新編內外科護理學下冊(七版，18-47-18-82 頁)・永大。